

		شماره پرونده:	
نام خانوادگی:	نام:	بخش:	پزشک معالج:
		اتاق:	
		تخت:	
نام پدر:	تاریخ تولد:	تشخیص (علت بستری):	تاریخ پذیرش:
	جنس: <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد		

بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:

مراقبت در منزل:

- در زمان انجام پلاسمافرز میزان آهن خون و اومگا ۳ و پروتئین خون خود را با مواد غذایی حاوی این مواد جبران کنید، تخم مرغ، شیر، لبنیات، گوشت، آب گوشت، کباب مرغ، سوپ مرغ، ماهی فراوان، میوه جات مثل موز و پرتقال و هلو و شلیل و انگور و خربزه و ... باعث می شود تا قدرت بدن بالا رفته و تحمل انجام پلاسمافرز افزایش یابد. مواد غذایی حاوی آهن عبارتند از: انواع گوشتها (مخصوصا بوقلمون)، جگر، عدس، زرده تخم مرغ، اسفناج، کشمش و آلوی خشک
 - بهتر است همزمان با مصرف مواد آهن دار، میوه ها و سبزیجاتی که ویتامین سی دارند (مانند: پرتقال، لیمو شیرین، سبزی خوردن، گوجه فرنگی، فلفل دلمه‌ای و نارنگی) و موادی که کلسیم دارند بیشتر مصرف شود تا جذب آهن بیشتر شود.
 - خوردن چای بعد غذا جزو عادات غلط است زیرا باعث می شود جذب آهن کمتر شود. از خوردن الکل و مواد کافئین دار مانند چای، قهوه خودداری کنید.
 - انجام فعالیت در زمان بعد از انجام پلاسمافرز مانعی ندارد و با توجه به شرایط جسمی خود می توانید ورزش کنید.
 - از انجام پلاسمافرز و جایگزینی پلاسمای مصنوعی ترسی نداشته باشید.
 - در صورتی که لوله رگ مرکزی در گردن شما ثابت شده باشد از تکان شدید گردن به علت خارج شدن آن خودداری کنید.
 - محل قرار گرفتن لوله های داخل رگ ها را از نظر خونریزی کنترل کنید.
 - ۲ تا ۳ جلسه پس از انجام پلاسمافرز آزمایش انعقادی به صورت روزانه و یا قبل از هر جلسه طبق دستور پزشک انجام خواهد گرفت.
 - در صورتی که پزشک به شما پیشنهاد انجام پلاسمافرز را می دهد، حتما آن را انجام دهید.
 - جلسات پلاسمافرز را در زمان مقرر و تعیین شده انجام دهید و آن به تاخیر نیندازید.
- در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان مراجعه کنید**
- خارج شدن لوله رگ مرکزی در گردن
 - خونریزی و نشست خون از لوله
 - خونریزی از بینی و اندام های بدن