

		شماره پرونده:	
نام خانوادگی:	نام:	بخش: اتاق: تخت:	پزشک معالج:
نام پدر:	تاریخ تولد: جنس: <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد	تشخیص (علت بستری):	تاریخ پذیرش:

بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:

مراقبت در منزل:

مراقبت های زمان قرار دادن منبع پرتودرمانی داخلی کاشتنی

- ممکن است زمان قرار دادن کاتتر شما را بیهوش کنند یا محل ورود کاتتر را بی حس کنند، تا هنگام قرار دادن این ابزار دردی احساس نشود. اگر بهوش هستید، از شما خواسته می شود بی حرکت بمانید تا کاتتر را در جای خود کار بگذارند. چنانچه احساس ناراحتی کردید، به پزشک یا پرستار بگویید تا مسکن داده شود.

- پرستاران یا دیگر کارکنان بیمارستان در زمانی که شما میزبان بالای اشعه دریافت می کنید سعی می کنند کم تر پیش شما بمانند. آنها تمام اطلاعات و مراقبت هایی مورد نیاز را در اختیار شما قرار می دهند، اما ممکن است با فاصله از شما بایستند یا از پنجره صحبت کنند.

ملاقات کنندگان نکات زیر را در هنگام تماس با شما رعایت نمایند

- در روزهای اول که منبع تشعشع در بدن کار گذاشته شده به ملاقات نیایند.
- پیش از آمدن به اتاق با کارکنان بیمارستان هماهنگی کنند.
- ملاقات ها را کوتاه کنند (روزی ۳۰ دقیقه یا حتی کم تر) مدت زمان ملاقات ها بستگی به نوع پرتودرمانی و قسمتی از بدن شما که درمان می شود، دارد.

- به جای ورود به اتاق در درگاه بایستند.

- افراد زیر ۱۸ سال و خانم های باردار به ملاقات نیایند.

مراقبت های بعد از خارج کردن منبع پرتودرمانی

- محل قرار گرفتن کاتتر ممکن است تا چند ماه حساس باشد.
- بعد از بیرون آوردن کاتتر، از بدن شما پرتو ساطع نمی شود. نیازی نیست افراد از شما دوری کنند، حتی کودکان و خانم های باردار نیز می توانند به شما نزدیک شوند.

- تا یکی دو هفته فعالیت های شدید خود را محدود کنید. از پزشک بپرسید که چه فعالیت هایی برای شما بی خطر است.

- گاهی پس از ترک بیمارستان نیز لازم است برخی حدود ایمنی مانند عدم ارتباط طولانی با افراد دیگر را رعایت کنید. پزشک یا پرستار شما را از حدود ایمنی که بعد از رفتن به منزل باید رعایت کنید، مطلع می کنند.

- با متخصص تغذیه در مورد رژیم غذایی مناسب مشورت کنید.

- احساس ترس، افسردگی و اضطراب یک امر طبیعی است می توانید در مورد آن ها با یک روانشناس صحبت کنید.

در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان مراجعه کنید

- قرمزی، تورم و خروج ترشحات از محل کاتتر