

## تشخیص بیماری

معاینه

لاپاراسکوپی

## درمان

در ۷۵٪ نوزادان تا شش ماهگی بیضه نزول نکرده کودکان نزول می کند و بعد از شش ماهگی به ندرت نزول می کند.

از هورمون درمانی ( LH یا HCG ) و درمان دیگر جراحی است که معمولاً در سن ۶ ماهگی تا ۹ ماهگی انجام می شود.

در این عمل بیضه را وارد کیسه می کنند و آن را بخیه می زنند



## UDT چیست؟

UDT نارسایی در سیر نزول یک یا دو بیضه از طریق کانال اینگوئینال به اسکروتوم است.

بیضه ی نزول نکرده اغلب با فتق های مادرزادی و بیضه های غیر طبیعی همراه بوده و در کودکان نارس بیشتر دیده می شود و بیشتر در معرض خطر پیچ خوردگی قرار دارد.

## علائم

\* عدم لمس بیضه توسط والدین

\* کوچک بودن بیضه ی سمت نزول

نکرده



مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

ارومیه

## **UDT**

دکتر رحمان خسروی

فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان

منبع : نلسون بیماریهای ارولوژی ۲۰۲۰

پرستاری کودکان ۲ ونگ



**\*\*توجه :** مادر گرامی کودکان به علت سن

پایین در معرض سقوط از تخت می باشند که

عوارض جبران ناپذیر دارد خواهشمند است

مراقب سقوط کودک از تخت باشید.

## اهداف درمان

- \* جلوگیری از تخریب بیضه به دلیل درجه حرارت بالاتر بدن نسبت اسکروتوم
- \* کاهش سرطان
- \* جلوگیری از وارد شدن تروما
- \* جلوگیری از تبعات روانی
- \* جلوگیری از ناباروری



## مراقبت های بعد عمل

- \* جلوگیری از عفونت با تمیز نگه داشتن محل عمل جراحی از ادرار و مدفوع
- \* آماده سازی والدین برای مراقبت از کودک در خانه و مشاهده علائم عفونت مانند درد، تورم و قرمزی
- \* جلوگیری از فعالیت شدید جهت جلوگیری از جابه جایی

## بیضه ها

- \* مراجعه به پزشک یک هفته و سه ماه بعد برای اطمینان از قرار گرفتن بیضه در داخل کیسه اسکروتوم

زمان پذیرش بیمار لطفا از مسئول بخش یا مسئول شیفت در مورد نحوه تهیه غذا برای همراه بیمار با قیمت مناسب توضیحات لازم اخذ شود. اگر بعد از ترخیص نیاز به مشاوره تلفنی داشتید با شماره های ذیل تماس بگیرید .

کارشناس آموزش : ۰۴۴۳۱۹۷۷۳۳۰

شماره داخلی بخش :

آدرس پست الکترونیک:

[motahari-h-urm@umsu.ac.ir](mailto:motahari-h-urm@umsu.ac.ir)