

علائم بالینی:


- وجود خون در ادرار
- درد پهلو و استفراغ در کودکان
- عفونت ادرار (سوزش ادرار، تب، قطره قطره ادرار کردن) و در بعضی از کودکان افزایش فشار خون

لازم به ذکر است که گاهی این ناهنجاری بدون علامت است
تشخیص:

بیماری با سونوگرافی از کلیه، مثانه و حالب و عکس برداری از کلیه، مثانه و حالب قابل تشخیص است.

UPJO:

یکی از ناهنجاری های سیستم ادراری، انسداد حالب در محل اتصال به لگنچه (UPJO) است که بیشتر در پسر ها دیده می شود.



علت ناهنجاری:

انتقال ژنتیکی مشخصی ندارد ولی ممکن است در چندین عضو یک خانواده دیده شود ولی علت دقیق انسداد اغلب نامشخص است.



مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

ناهنجاری های سیستم ادراری

(UPJO)

دکتر رحمان خسروی

فوق تخصص جراحی کودکان

منبع: نلسون بیماریهای ارولوژی ۲۰۲۰

پرستاری کودکان ۲ ونگ



درمان:

تنها راه درمان این بیماری عمل جراحی است. با توجه به کم عارضه بودن بیهوشی در سنین پایین، جراحی در سنین نوزادی توصیه می شود.

مراقبت قبل عمل:

از دو روز قبل از جراحی لبنیات و غذای های نفاخ مصرف نکند. یک روز قبل از عمل مایعات صاف شده مصرف کند. در صورت توصیه پزشک شستشوی روده (انما) قبل از عمل انجام شود. طبق دستور پزشک از شب قبل از بستری بیمار ناشتا باشد



مراقبت های بعد عمل

روز اول پس از عمل رژیم مایعات و روز دوم معمولی شروع می شود.

بیمار پس از عمل سوند مجرا و درن دارد، سوند روز دوم پس از عمل و درن هنگام ترخیص خارج می شود از داخل مثانه تا حالب یک سوند خارجی به نام DJ برای بیمار گذاشته میشود که ۳۰-۴۰ روز پس از عمل توسط دکتر در اتاق عمل خارج می شود

مراقبت های در منزل:

در صورتی که پس از ترخیص بیمار قطره قطره ادرار کند یا توان نگه داشتن ادرار نداشته باشد احتمال جا به جا شدن سوند DJ وجود دارد باید به پزشک مراجعه کند.

در صورت وجود درد در ناحیه می تواند با نوشیدن مایعات گرم و تغییر وضعیت بدن درد را کاهش دهد.

در صورت وجود ترشح از محل بخیه ها و درن و تورم در محل عمل باید به پزشک مراجعه کند

زمان پذیرش بیمار لطفاً از مسئول بخش یا مسئول شیفت در مورد نحوه تهیه غذا برای همراه بیمار با قیمت مناسب توضیحات لازم اخذ شود.

اگر بعد از ترخیص نیاز به مشاوره تلفنی داشتید با شماره های ذیل تماس بگیرید .
کارشناس آموزش : ۰۴۴۳۱۹۷۷۳۳۰

شماره داخلی بخش :
آدرس پست الکترونیک:

motahari-h-urm@umsu.ac.ir

****توجه :** مادر گرامی کودکان به علت سن پایین در معرض سقوط از تخت می باشند که عوارض جبران ناپذیر دارد. خواهشمند است مراقب سقوط کودک از تخت باشید.