



مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

## آبسه

دکتر امیر نسیم فر

فوق تخصص عفونی کودکان

منبع : پرستاری کودکان و ونگ



## آبسه چیست؟

آبسه تجمع چرک در یک قسمت از بدن است. چرک مایع غلیظی است که معمولاً حاوی گلبول های سفید، بافت مرده و میکروب ها است. معمولاً عفونت باکتریایی باعث ایجاد آبسه می شود. این عفونت باکتریایی باعث می شود سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با باکتری ها گلبول های سفید خون و مواد شیمیایی خاصی را فعال کند. در این مبارزه برخی باف های بدن می میرند. با مردن بافت یک حفره تشکیل شده و از چرک پر می شود. اگر عفونت ادامه داشته باشد این حفره بزرگتر می شود.



آبسه ها کجا تشکیل می شوند؟

۱ - زیر پوست: بیشتر آبسه ها زیر پوست

تشکیل می شوند. مثل، صورت قفسه سینه، باسن

یا مناطق رویش مو مثل کشاله ران یا ساعد.

۲- داخل بدن: گاهی اوقات آبسه در داخل یک

اندام و یا فضای بین اندام ها تشکیل می شود. بسته به محل ایجاد آن آبسه می تواند علائم مختلفی داشته باشد.

دلایل آبسه:

بیشتر آبسه های پوستی دلایل خاصی ندارند. ولی افراد دیابتیک و افراد دچار نقص ایمنی بدن بیشتر مستعد ایجاد آبسه هستند.

تشکیل مکرر آبسه های پوستی می تواند علامتی از وجود یک مشکل در سیستم ایمنی بدن می باشد. علائم:

وجود آبسه می تواند با علائم زیر همراه باشد

- تب

- حالت تهوع

- لرز

- ورم

- ضایعه پوستی

- ترشح مایع از محل آبسه

- دردناک بودن اطراف آبسه

- پوست ملتهب

## درمان:

برای درمان آبسه پزشک آنتی بیوتیک تجویز می کند. و با توجه به نظر پزشک آبسه می تواند تخلیه شود.

در آبسه های پوستی با یک جراحی کوچک پوست روی آبسه را برش می دهند تا چرک آن خالی شود. برای آبسه های داخل بدن هم جراحی لازم است.

## آبسه مقعدی

غده هایی در اطراف مقعد هستند که گاهی بسته می شوند. بسته شدن دهانه این غدد منجر به عفونت، تورم و التهاب می شود. آبسه مقعدی ناشی از تجمع چرک ناشی از عفونت این غده هاست.


برخی اوقات چرک آبسه به قسمت های عمیق تر نفوذ کرده. انواع آبسه های مقعدی عمیق تر را ایجاد می کند بیمار در این حالت در نشستن و راه رفتن دچار مشکل می شود. گاهی دهانه پوست اطراف مقعد باز می شود و از آن چرک و خون تخلیه می شود.

## علائم آبسه مقعدی:

- درد شدید در لبه مقعد
  - قرمزی و التهاب بافت های اطراف مقعد
  - ورم موضعی
  - تب در آبسه های عمیق تر و شدید تر
- درمان آبسه مقعدی:
- تنها درمان جراحی می باشد. با باز کردن و تخلیه آبسه.

## درمان های جانبی بعد از عمل:

- نشستن در لگن آب ولرم و بتادین روزی ۳-۴ بار هر دفعه تقریبا ربع ساعت
- رعایت بهداشت مقعد



زمان پذیرش بیمار لطفا از مسئول بخش یا مسئول شیفت در مورد نحوه تهیه غذا برای همراه بیمار با قیمت مناسب توضیحات لازم اخذ شود.

اگر بعد از ترخیص نیاز به مشاوره تلفنی داشتید با شماره های ذیل تماس بگیرید.  
کارشناس آموزش: ۰۴۴۳۱۹۷۷۳۳۰  
شماره داخلی بخش:

آدرس پست الکترونیک:

[motahari-h-urm@umsu.ac](mailto:motahari-h-urm@umsu.ac)

**\*\*توجه: مادر گرامی کودکان به علت سن پایین در معرض سقوط از تخت می باشند که عوارض جبران ناپذیر دارد. خواهشمند است مراقب سقوط کودک از تخت باشید.**