



تب تورم و قرمزی درد (اغلب درد های ضربان دار) هنگام لمس مفاصل که گاهی به مفاصل دیگر نیز انتشار می یابد. همچنین کودک ممکن است از تکان دادن مفصل یا اندام گرفتار خودداری کرده و ان را در یک وضعیت خاص بطور ثابت نگه دارد. مثلاً یکی از پاهای خود را بالا نگه داشته و از زمین گذاشتن ان امتناع کند.

#### - آرتربیت عفونی یا چرکی:

التهاب مفصل به وسیله باکتری های مختلف (شامل استافیلوکوک، استرپتوکوک، پنوموکوک و سالمونلا) می باشد. این نوع آرتربیت بیشتر در شیرخواران زیر یکسال بوجود می آید. در کودکان بزرگ تر ممکن است در اثر زخم های نافذ نزدیک مفصل به وجود بیاید. در این نوع آرتربیت، مفصل متورم، دردناک و قرمز می شود. و معمولاً کودک مبتلا به آن، تب دارد.



## آرتربیت

اغلب، مفاصل انگشتان دست، پا، مج، قوزک، آرنج، زانو، شانه، لگن، فک و مهره ها را درگیر می کند. شش نوع آرتربیت ممکن است در کودکی به وجود بیایند: آرتربیت روماتوئید، آرتربیت همراه با تب رماتیسمی حاد، آرتربیت عفونی، آرتربیت آرژیک، آرتربیت به دنبال عفونت ویروسی و آرتربیت ناشی از سرخجه. آرتربیت روماتوئید، ممکن است بعد از یک سالگی در هر سنی اتفاق بیفتد. علت آن هنوز نامشخص است. آرتربیت می تواند یکی یا تعدادی از مفاصل را درگیر کند. مفاصل، متورم، گرم، سفت و دردناک می شوند (درد خفیف تا متوسط) ولی معمولاً قرمز نمی شوند. در نیمی از موارد، گردن نیز درگیر می شود. آرتربیت ممکن است ماهها قبل یا بعد از این که سایر علائم بیماری مانند تب، تحریک پذیری، بی اشتھائی و بثورات ریز جلدی برطرف شوند به وجود بیاید. مفصل جائی است که دو یا چند استخوان با هم تلاقی می کند، غضروف، استخوان ها را محافظت می کند و برای آنها حالت بالشتکی را دارد. مایعات مفصلي گوناگونی در حفره سینوویال که به وسیله غشاء نازکی که سینوویوم خوانده می شود پوشیده شده است، قرار دارند و به محافظت و نرم کردن مفصل کمک می کنند. در آرتربیت روماتوئید، سینوویوم باد می کند و ملتهب می شود. التهاب به تدریج غضروف را تخریب می کند. بافت جوش گاهی به تدریج جانشین غضروف تخریب شده می شود.



مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری  
ارومیه

## آرتربیت روماتوئید

دکتر امیر نسیم فر

فوق تخصص عفونی کودکان

منبع : پرستاری کودکان وونگ



## - آرتریت ویروسی:

بعد از یک بیماری ویروسی ایجاد می‌شود. علائم، مشابه دیگر انواع آرتریت بهویژه آرتریت روماتوئید می‌باشد.

آرتریت بعد از بیماری ویروسی بدون درمان خودبه‌خود، خوب می‌شود.

## - آرتریت آرژیک:

مفاصل سخت، متورم و قرمز هستند، ولی درد خفیف است. این نوع آرتریت در اثر یک واکنش آرژیک نسبت به نیش حشرات، داروها، غذاها یا ذرات کوچکی که از هوا استنشاق می‌شوند به وجود می‌آید. در این حالت معمولاً کهیر وجود دارد.

## - آرتریت سرخجه:

یکی از عوارض سرخجه است؛ یا این که به صورت واکنش نسبت به واکسن سرخجه بهویژه در کودکان بزرگ‌تر به وجود می‌آید. آرتریت سرخجه نیاز به درمان ندارد.

## علائم و نشانه‌ها:

در تمام مواردی که درد و محدودیت حرکات مفصلی وجود دارد، آرتریت باید در نظر گرفته شود. مگر مواردی که آسیب فیزیکی به مفصل وارد آمده باشد. تشخیص آرتریت باید به عهده پزشک گذاشته شود.

## علل زمینه ساز ابتلا کودک به بیماری

- ۱- بروز یک بیماری که مقاومت بدن را کم کرده
- ۲- اعمال جراحی روی مفصل
- ۳- وجود مفصل مصنوعی
- ۴- تزریق داخل مفصل
- ۵- بهداشت پائین
- ۶- دیابت

## موارد احتیاط:

- ۱- آرتریت عفونی یک اورژانس است و تأخیر درمان برای ۲۴ ساعت می‌تواند موجب صدمه دائمی به مفصل شود.
- ۲- آرتریت روماتوئید یا تب روماتیسمی نیازمند درمان سریع برای به حداقل رساندن آسیب دارند. ولی اورژانس تلقی نمی‌شوند.
- ۳- آرتریت روماتوئید، می‌تواند تنها به صورت تب طول کشیده غیر قابل توجیه و بدون هیچ علامت دیگر آرتریت (مانند قرمزی، درد یا بادکردگی) وجود داشته باشد.
- ۴- رژیم غذایی سرشار از ویتامین C و پرپروتئین فراهم آورده و کودک را به مصرف مایعات کافی تشویق نماییم.
- ۵- توصیه به مصرف به موقع آنتی بیوتیک و تکمیل کامل دوره درمان حتی زمانیکه همه علایم در ظاهر بهبود پیدا کرده اند.
- ۶- در صورت صلاح‌حید پزشک معالج تمرينات مخصوص جهت باز گرداندن حرکت مفصل پس از شروع درمان

زمان پذیرش بیمار لطفاً از مسئول بخش یا مسئول شیفت در مورد نحوه تهیه غذا برای همراه بیمار با قیمت مناسب توضیحات لازم اخذ شود.

اگر بعد از ترخیص نیاز به مشاوره تلفنی داشتید با شماره های ذیل تماس بگیرید.

کارشناس آموزش : ۰۴۴۳۱۹۷۷۳۰

شماره داخلی بخش :

آدرس پست الکترونیک:

motahari-h-urm@umsu.ac.ir

## درمان پزشکی:

برای ارزیابی آرتریت، تست‌های زیادی لازم هستند. این تست‌ها می‌توانند شامل انجام گرافی رادیولوژی تست‌های خونی، کشت خون، الکتروکاردیوگرام، بررسی مایع مفصلی و کشت مدفعه باشد.

درمان می‌تواند شامل آنتی بیوتیک، تخلیه مفصل، دوزهای بالای آسپیرین (جایگزین‌های آسپیرین همان اثر راندارند) یا استروئیدهای خوراکی باشد.

- اگر تشخیص، آرتریت حساسیتی باشد، پزشک می‌تواند آنتی هیستامین‌های خوراکی را برای برطرف کردن علائم تجویز کند.

- اگر تشخیص آرتریت سرخجه یا ویروسی باشد، هیچ درمانی لازم نیست.

- مسکن جهت کاهش درد

- استفاده از آتل یا گچ برای استراحت کامل مفصل

- جراحی برای تخلیه مایع عفونی شده یا خارج کردن جسم خارجی وارد شده به مفصل گاهی ضروری می‌باشد.

## مراقبت خانگی:

هیچ درمان خانگی تا هنگامی که پزشک تشخیص نداده است قابل قبول نیست. تلاش در درمان خانگی فقط می‌تواند منجر به تأخیر درمان اساسی شود. همچنین درمان خانگی ممکن است تشخیص را مشکل تر کند. اگر پزشک در دسترس نیست مواد ضد درد مانند آسپیرین یا استامینوفن، می‌تواند موقتاً ناراحتی را کاهش دهد. مفاصل درگیر را استراحت داده یا بی‌حرکت کنید