

### آمادگی قبل از برونکوسکوپی

- ۱- مدت زمان ۸-۶ ساعت قبل از برونکوسکوپی از خوردن و آشامیدن اجتناب کنید
- ۲- قبل از برونکوسکوپی برگه رضایت توسط همراه به دقت مطالعه و سپس امضاء شود
- ۳- داشتن یک نفر همراه الزامی می باشد
- ۴- بیمار از الک ناخن استفاده نکند
- ۵- در صورتی که دارو های خاص مصرف می کنید مانند دارو های ضد انعقاد ، دارو های قلبی، ضد فشارخون، ضد تشنج ، آسپرین و دارو های کاهش دهنده قند خون و ..... به پزشک و پرستار خود اطلاع دهید .
- ۶- در صورت داشتن هرگونه حساسیت دارویی به پزشک و پرستار خود اطلاع دهید.
- ۷- در صورت داشتن زیورالت و وسایل فلزی، لنز چشمی آنها را خارج کنید .

### برونکوسکوپی چیست؟

یک اقدام تشخیصی و درمانی است. که دو نوع دارد:  
 ۱- برونکوسکوپی فیبروتیک یا نرم که شامل توضیحات زیر می باشد . در آن پزشک با دستگاه برونکوسکوپی که مشابه لوله نرم و قابل انعطاف می باشد از راه دهان یا بینی وارد راه های هوای شده و از این طریق دسترسی به راههای هوایی امکان پذیر می شود.  
 برونکوسکوپی تشخیصی هنگامی انجام می پذیرد که از طریق شرح حال تاریخچه بیماری، و اقدامات پاراکلینیکی تشخیص قطعی میسر نباشد هم چنین می توان از این طریق راه های هوایی نمونه برداری انجام داد.



۲- برونکوسکوپی سخت که بیشتر برای خارج کردن جسم خارجی از داخل راه هوایی بکار می رود  
 برونکوسکوپی روش ایده ال برای برداشتن توده های راه های هوایی بزرگ ، گشاد کردن تنگی های نای، لیزر و در آوردن اجسام خارجی است. مشخص کردن ماهیت ناهنجاریهای داخل ریه مانند بیماریهای عفونی و غیرعفونی ، گرفتن نمونه از ضایعات دیده شده در راه هوایی از دیگر مزایای این روش محسوب می شود.




مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه  
 راهنمای والدین در مورد برونکوسکوپی

دکتر صلواتی زاده

فوق تخصص ریه کودکان

منبع: پرستاری کودکان وونگ



## مدارک مورد نیاز :

- ۱-دستور پزشک جهت انجام برونکوسکوپی
- ۲-گرافی قفسه سینه
- ۳- سی تی اسکن ریه در صورتی که قبلاً انجام شده است
- ۴-جواب اسپیرمتری قبلی
- ۵-جواب آزمایشات ان عقاد خون ( PTT,PT جهت برونکوسکوپی سخت بکار می رود و شمارش کامل گلبولهای قرمز خون diff (CBC) الزامی و Na ، K ، BUN ، Cr جهت پذیرش اتاق عمل الزامی است.
- ۶-در صورت سابقه بیماری قلبی مشاوره قلب از نظر ریسک بیهوشی الزم است.



## مواردی که در حین برونکوسکوپی انجام می شود:

- ۱-گرفتن یک رگ بازجهت تزریق دارو
- ۲-بیهوشی از طریق دارویی تزریقی یا استنشاقی
- ۳-بیمار اکسیژن از طریق ماسک بیهوشی دریافت می کند
- ۴-مانیتورینگ قلبی و پالس اکسی متری که تحت نظر متخصص بیهوشی انجام می گیرد .بعد از برونکوسکوپی چه باید کرد؟
  - ۱-پوزیشن نیمه نشسته باشدچ
  - ۲- یک الی دو ساعت بعد از انجام برونکوسکوپی نباید از راه دهان چیزی بخورد

- ۳- برای شروع خوردن بعد از هوشیاری کامل از مایعات استفاده کنید

- ۴- در صورت گرفتن نمونه از ریه و راه تنفسی بلافاصله آزمایشگاه فرستاده شود

## علائح خطر بعد از انجام برونکوسکوپی

### چیست؟

بی قراری، کبودی و سیاه شدن لبها و نوک انگشتان ، تنگی نفس و نامنظم شدن ضربان

قلب، خونریزی به صورت خلط خونی شدید با علائم بی قراری و کاهش فشار خون و افزایش ضربان قلب، گرفتگی حنجره با عالمت خشن شدن صدا و زخم شدن گلو، بروز تب در شب اول در صورت بروز هر کدام از علائم سریعاً به پرستار خود اطلاع دهید.

زمان پذیرش بیمار لطفاً از مسئول بخش یا مسئول شیفت در مورد نحوه تهیه غذا برای همراه بیمار با قیمت مناسب توضیحات لازم اخذ شود.

اگر بعد از ترخیص نیاز به مشاوره تلفنی داشتید با شماره های ذیل تماس بگیرید .

کارشناس آموزش : ۰۴۴۳۱۹۷۷۳۳۰

شماره داخلی بخش :

آدرس پست الکترونیک:

[motahari-h-urm@umsu.ac.ir](mailto:motahari-h-urm@umsu.ac.ir)

**\*\*توجه :** مادر گرامی کودکان به علت سن پایین در

معرض سقوط از تخت می باشند که عوارض جبران ناپذیر

دارد. خواهشمند است مراقب سقوط کودک از تخت

باشید