



علائم هیدروسل چیست؟

هیدروسل معمولاً ایجاد درد نمی‌کند مگر اینکه با عفونت یا ضربه و یا با پیچش بیضه (تورشن) همراه باشد. اندازه هیدروسل در طول روز متغیر بوده و در صورت زیاد ایستادن در طول روز بیشتر می‌شود.


هیدروسل در نوزادان زود رس و با وزن پایین شایع‌تر است.

در مواردی هم ممکن است به دنبال عفونت بیضه جراحی واریکوسل یا به دنبال ضربه به ناحیه تناسلی باشد.



هیدروسل چه بیماری است؟

تجمع آب در ناحیه اطراف بیضه که معمولاً دردناک نیست و ممکن است موجب احساس سنگینی یا ناراحتی در ناحیه بیضه شود را هیدروسل می‌گویند.



تجمع آب اطراف بیضه



مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

راهنمای والدین در مورد مراقبت

از کودک مبتلا به هیدروسل

دکتر رحمان خسروی

فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان

منبع: پرستاری کودکان وونگ



****توجه :** مادر گرامی کودکان به علت سن پایین در معرض سقوط از تخت می باشند که عوارض جبران ناپذیر دارد. خواهشمند است مراقب سقوط کودک از تخت باشید.

زمان پذیرش بیمار لطفاً از مسئول بخش یا مسئول شیفت در مورد نحوه تهیه غذا برای همراه بیمار با قیمت مناسب توضیحات لازم اخذ شود.

اگر بعد از ترخیص نیاز به مشاوره تلفنی داشتید با شماره های ذیل تماس بگیرید .
کارشناس آموزش : ۰۴۴۳۱۹۷۷۳۳۰

شماره داخلی بخش :

آدرس پست الکترونیک:

motahari-h-urm@umsu.ac.ir

مراقبت بعد عمل در منزل

✓ از ضربه به ناحیه عمل جلوگیری شود.

✓ رژیم غذایی پر فیبر باشد تا از بروز یبوست جلوگیری کند.

✓ بعد از ترخیص استحمام منعی ندارد.

✓ ناحیه عمل تمیز نگه داشته شود و یا با سشوار کاملاً محل عمل خشک شود.

✓ از پوشیدن لباس زیر تنگ و

پلاستیکی جلوگیری شود

✓ از لباس نخی استفاده گردد.



چگونه تشخیص می دهند؟

با معاینه بیضه ها توسط پزشک ارولوژیست تشخیص داده می شود. در مواقعی که پزشک به پیچش بیضه شک کند اسکن هسته ای یا سونوگرافی داپلر انجام می شود.

درمان آن چیست؟

در صورتی که تا یک سالگی بهبود پیدا نکند جراحی است.

در برخی موارد شانس عود مجدد هیدروسل و نیاز به عمل جراحی مجدد وجود دارد.

